

Clematis (Viticella-Gruppen) 'Mrs T. Lundell' E - viticella-klematis 'Mrs T. Lundell' E

Färgstark klätterväxt med långblomningstid

KORT VÄXTBESKRIVNING

- Växtnamn: Clematis (Viticella-Gruppen) 'Mrs T. Lundell' E
- viticella-klematis 'Mrs T. Lundell' E
Tidigare svenskt namn för sortgruppen: italiensk klematis
- Härdighet: Zon 1-5(6)
- Växtsätt: Klängande, höjd 3-4 m
- Blomning: Öppen blomform med 4 blomblad, 5-6 cm i diameter. Ljust blåvioletta blommor med grönvita ståndare. Rikligt med blommor på årsskotten i juli - oktober.
- Blad/grenar: Starkvuxen med skirt grönt bladverk
- Växtplats: Sol-skugga, ej för torrt
- Användning: Spaljéer, plank, vid träd
- Övrigt: Plantera med rothalsen 10 cm under markytan. Beskäres på senhösten.
- E-merit: Riklig blomning
- Ursprung: Selektion av Magnus Johnson, Södertälje.

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING

Bakgrund/ursprung

Viticella-klematis växer vild i södra Europa till Mindre Asien. Den har varit i kultur flera hundra år. Förädlingen och utvecklingen av den mångfald vi kan se idag satte fart under senare hälften av 1800-talet. Viticella-klematis 'Mrs T. Lundell' E har sitt ursprung i Magnus Johnsons specialplantaskola för klematis i Södertälje och bygger på dennes förädlingsarbete.

Beskrivning

Viticella-klematis 'Mrs T. Lundell' E blommar från juli till oktober med blåvioletta blommor med grönvita ståndare. Den har öppen blomform med 4 blomblad, 5-6 cm i diameter. Den är starkväxande och kan i ett bra läge utan problem ta sig upp till 4 meters höjd. I mitten till slutet av maj kommer starkväxande kantiga skott från basen eller högre upp från kraftiga stammar. Bladverket är skirt grönt. Den klättrar med småbladens skaft.

Det som vi uppfattar som klematisblommor består egentligen av färgade och sammanvuxna foder och blomblad, i facklitteraturen benämnda tepaler.

Växtplats

Denna grupp av klematis har större krav på värme, vatten och näring än andra småblommiga. Härdigheten är inte helt utredd men de fungerar i zon 6, även om man så långt norrut måste ge dem bästa odlingsförutsättningarna, vilket bl a betyder skyddade söderväggar.

Det är viktigt att alltid plantera plantor av viticella-klematis med rothalsen ca 10 cm under markytan. Även om plantan fryser ner till markytan brukar den alltid komma igen med nya skott från basen.

Även om den inte fryser ner är det lämpligt att klippa in i plantan och framför allt avlägsna det klenare fjolårsriset. Karaktären blir annars snabbt risig. De bör inte stå i alltför blåsiga lägen, där de lätt blåser av eller omkull. Varje höst kan man med fördel dressa planteringen med brunnen naturgödsel.

Användning

Viticella-klematis kan användas både till spaljéer och pergolor. Dessutom är den med sin långa utdragna blomning mycket lämpliga som komplettering i vanliga prydnadsbuskage. Om de planteras vid fristående trestöd av t ex armeringsjärn kan man lyfta upp de starkfärgade blomkaskaderna till höjder på 1,25 till 2,5 m. Men glöm inte stödgödsling och stödvattning om de planteras in i buskage. Konkurrensen kan annars hämma utvecklingen alltför mycket.

Viticella-klematisen och sorter av den är mycket lämpliga till offentliga och halvoffentliga planteringar. Inga andra växter ger sådan prakt under så lång tid med så liten skötselinsats som dessa kräver.

Förökning

Viticella-klematis förökas med örtartade sticklingar före blomningen.

Växtbeskrivning/källa

Tomas Lagerström, SLU/Ultuna

Publicerad i Gröna Fakta 4/1998, Växter för framtiden III. Movium/SLU.

Litteratur:

Aldén, B. mfl. 1998. Kulturväxtläxikon. LT. (under utgivning).

Johnson, M. 1996. Släktet Klematis. Magnus Johnsons Plantskola AB, Södertälje.

Krussman, G. 1976. Handbuch der Laubgehölze, Band 1,2 Auflage. Paul Parey.

Lagerström, T. 1997. Småblommiga klematis = lättodlade klematis. SLU, Fakta Trädgård-Fritid nr 60 1997.